江苏省仪征中学 2019 届高三下学期数学周末限时训练 3

数学 I

一. 填空题：本大题共 14 小题，每小题 5 分，共 70 分。请把答案填写在答题卡相应位置。

- 集合 $A = \{1, 3\}$, $B = \{a^2 + 2, 3\}$, 若 $A \cup B = \{1, 2, 3\}$, 则实数 a 的值为_____.
- 复数 $z = (2+i)(1-i)$, 其中 i 为虚数单位, 则 z 的虚部为_____.
- 从集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中分别取两个不同的数 a, b 作为对数的底数和真数, 则事件“对数值大于 2”的概率为_____.
- 甲、乙两个城市 2017 年夏季连续 5 天中, 每天的最高气温 ($^{\circ}\text{C}$) 数据如下:

城市	每天的最高气温				
	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天	第 5 天
甲	28	31	27	33	31
乙	25	26	29	34	36

则这 5 天中, 每天最高气温较为稳定(方差较小)的城市为_____. (填甲或乙).

- 在平行四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} = \left(\frac{5}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{AD} = \left(-\frac{3}{2}, 2\right)$, 则四边形 $ABCD$ 的面积为_____.

- 根据如图所示的伪代码, 最后输出的 i 的值为_____.

```

T ← 1
i ← 3
While T < 10
    T ← T + i
    i ← i + 2
End While
Print i
    
```

- 若不等式组 $\begin{cases} x \geq 0 \\ 2x + y \leq 4 \\ x + 2y \geq 4 \end{cases}$ 所表示的平面区域被直线 $y = kx + 4$ 分为面积相等的两部分, 则 k 的值为_____.

- 将函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位, 得到函数 $y = f(x)$ 的图象, 则 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ 的值为_____.

- 一个封闭的正三棱柱容器, 高为 3, 内装水若干(如图甲, 底面处于水平状态), 将容器放倒(如图乙, 一个侧面处于水平状态), 这时水面与各棱交点 E , F , F_1 , E_1 分别为所在棱的中点, 则图甲中水面的高度为_____.

10. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 过原点 O 且倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线 l 与椭圆 E 相交于 A, B 两点, 若 $\triangle AFB$ 的周长为 $4 + \frac{8\sqrt{13}}{13}$, 则椭圆方程为_____.

11. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知圆 $O_1: x^2 + y^2 = 9$, 圆 $O_2: x^2 + (y-6)^2 = 16$, 在圆 O_2 内存在一定点 M , 过 M 的直线 l 被圆 O_1 , 圆 O_2 截得的弦分别为 AB , CD , 且 $\frac{AB}{CD} = \frac{3}{4}$, 则定点 M 的坐标为_____.

12. 已知点 P 是边长为 $2\sqrt{3}$ 的正三角形 ABC 内切圆上的一点, 则 $\overline{PA} \cdot \overline{PB}$ 的取值范围为_____.

13. 已知 x, y, z 均为正数, $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 2$, $x + 2y + 2z = xyz$, 则 xyz 的最小值为_____.

14. 数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_i = k^2$ ($2^k \leq i < 2^{k+1}$, $i \in \mathbf{N}^*$, $k \in \mathbf{N}$), 则满足 $a_i + a_{2i} \geq 100$ 的 i 的最小值为_____.

二. 解答题: 本大题共 6 小题, 共计 90 分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或计算步骤.

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $|\overline{CA} + \overline{CB}| = |\overline{CA} - \overline{CB}|$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 若 $CD \perp AB$, 垂足为 D , 且 $CD = 4$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最小值.

16. 如图, 在四棱锥 $E-ABCD$ 中, 已知底面 $ABCD$ 为平行四边形, $AE \perp BC$, $\triangle BCE$ 为锐角三角形, 面 $AEB \perp$ 面 BCE , 设 F 为 CE 的中点.

求证: (1) $AE \parallel$ 面 BDF ; (2) $AE \perp$ 面 BCE .

17. 如图, 某生态农庄内有一直角梯形区域 $ABCD$, $AB \parallel CD$, $AB \perp BC$, $AB = 3$ 百米, $CD = 2$ 百米. 该区域内原有道路 AC , 现新修一条直道 DP (宽度忽略不计), 点 P

在道路 AC 上 (异于 A, C 两点), $\angle BAC = \frac{\pi}{6}$, $\angle DPA = \theta$.

(1) 用 θ 表示直道 DP 的长度;

(2) 计划在 $\triangle ADP$ 区域内种植观赏植物, 在 $\triangle CDP$ 区域内种植经济作物. 已知种植观赏植物的成本为每平方百米 2 万元, 种植经济作物的成本为每平方百米 1 万元, 新建道路 DP 的成本为每百米 1 万元, 求以上三项费用总和的最小值.

18. 椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的焦距为 $2\sqrt{3}$, 点 PQ 关于直线 $y = -x$ 的对称点在椭圆 M 上.

(1) 求椭圆 M 的方程;

(2) 如图, 椭圆 M 的上、下顶点分别为 A, B , 过点 P 的直线 l 与椭圆 M 相交于两个不同的点 C, D .

① 求 $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD}$ 的取值范围;

② 当 AD 与 BC 相交于点 Q 时, 试问: 点 Q 的纵坐标是否是定值? 若是, 求出该定值; 若不是, 说明理由.

19. 已知函数 $f(x) = e^x \left(a \ln x + \frac{2}{x} + b \right)$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$, $e \approx 2.71828$ 是自然对数的底数.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 的切线方程为 $y = e(x - 1)$, 求实数 a, b 的值;

(2) ①若 $a = -2$ 时, 函数 $y = f(x)$ 既有极大值, 又有极小值, 求实数 b 的取值范围;

②若 $a = 2, b \geq -2$, 若 $f(x) \geq kx$ 对一切正实数 x 恒成立, 求实数 k 的最大值(用 b 表示).

20. 已知两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 分别满足 $a_1 = 1, |a_{n+1} - a_n| = 2$, 且 $b_1 = -1, \left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| = 2$, 其中 $n \in \mathbf{N}^*$,

设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n, T_n .

(1) 若数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都为递增数列, 求数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 若数列 $\{c_n\}$ 满足: 存在唯一的正整数 k ($k \geq 2$), 使得 $c_k < c_{k-1}$, 称数列 $\{c_n\}$ 为“ k 坠点数列”.

①若数列 $\{a_n\}$ 为“5 坠点数列”, 求 S_n ;

②若数列 $\{a_n\}$ 为“ p 坠点数列”, 数列 $\{b_n\}$ 为“ q 坠点数列”, 是否存在正整数 m , 使得 $S_{m+1} = T_m$, 若存在, 求 m 的最大值; 若不存在, 说明理由.

数学 II (附加题)

21. [选修 4-2: 矩阵与变换] (本小题满分 10 分)

已知曲线 $y^2 = 2x$, 先将曲线 C 作关于 x 轴的反射变换, 再将所得图形绕原点顺时针旋转 90° 。

- (1) 求连续两次变换所对应的变换矩阵 M ;
- (2) 求曲线 C 在 T_M 作用下得到的曲线 C' 的方程.

22. [选修 4-4: 坐标系与参数方程] (本小题满分 10 分)

在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 C 的参数方程为
$$\begin{cases} x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ y = \frac{4t}{1+t^2} \end{cases} \quad (t \text{ 为参数}),$$
 以原点为极坐标系

的极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 直线 l 的极坐标方程 $\theta = \frac{\pi}{4} (\rho \in \mathbf{R})$. 设直线 l 与椭圆 C 相交于 A, B , 求线段 AB 的长.

23. (本小题满分 10 分)

某品牌汽车 4S 店经销 A, B, C 三种排量的汽车，其中 A, B, C 三种排量的汽车依次有 5, 4, 3 款不同车型。某单位计划购买 3 辆不同车型的汽车，且购买每款车型等可能。

- (1) 求该单位购买的 3 辆汽车均为 B 种排量汽车的概率；
- (2) 记该单位购买的 3 辆汽车的排量种数为 X ，求 X 的分布列及数学期望。

24. (本小题满分 10 分)

已知直线 $l: y = 2x - 4$ 与抛物线 $C: y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点， $T(t, 0) (t > 0 \text{ 且 } t \neq 2)$ 为 x 轴上任意一点，连接 AT, BT 并延长与抛物线 C 分别相交于 A_1, B_1 。

- (1) 设 A_1B_1 斜率为 k ，求证： $k \cdot t$ 为定值；
- (2) 设直线 AB, A_1B_1 与 x 轴分别交于 M, N ，令 $S_{\triangle ATM} = S_1, S_{\triangle BTM} = S_2, S_{\triangle B_1TN} = S_3, S_{\triangle A_1TN} = S_4$ ，若 S_1, S_2, S_3, S_4 构成等比数列，求 t 的值。

江苏省仪征中学 2019 届高三下学期数学周末限时训练 3 参考答案

一. 填空题:

1. 0; 2. -1; 3. $\frac{2}{25}$; 4. 甲; 5. 5; 6. 9; 7. $-\frac{7}{2}$; 8. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$;
 9. $\frac{9}{4}$; 10. $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$; 11. $(0, \frac{18}{7})$; 12. -3, 1; 13. 16; 14. 128.

二. 解答题:

15. 解: (1) 由 $|\overline{CA} + \overline{CB}| = |\overline{CA} - \overline{CB}|$, 两边平方 $|\overline{CA} + \overline{CB}|^2 = |\overline{CA} - \overline{CB}|^2$,

即 $(\overline{CA} + \overline{CB})^2 = (\overline{CA} - \overline{CB})^2$, 得到 $2\overline{CA} \cdot \overline{CB} = 0$, 即 $\overline{CA} \perp \overline{CB}$, 所以 $\angle C = \frac{\pi}{2}$.

(2) 在直角 $\triangle ADC$ 中, $AC = \frac{CD}{\sin A} = \frac{4}{\sin A}$, 在直角 $\triangle BDC$ 中, $BC = \frac{CD}{\sin B} = \frac{4}{\sin B}$,

又 $A \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\sin B = \sin(\frac{\pi}{2} - A) = \cos A$,

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} CA \cdot CB = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{\sin A} \cdot \frac{4}{\sin B} = \frac{8}{\sin A \cos A} = \frac{16}{\sin 2A}$,

由 $A+B = \frac{\pi}{2}$ 得, $2A \in (0, \pi)$, 故 $\sin 2A \in (0, 1]$,

当且仅当 $A = \frac{\pi}{4}$ 时, $(\sin 2A)_{\max} = 1$, 从而 $(S_{\triangle ABC})_{\min} = 16$.

16. (1) 证明: 连接 AC 交 BD 于 O , 连接 OF .

在平行四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 交 BD 于 O ,

则 O 为 AC 的中点, 又已知 F 为 BD 的中点, 所以 OF 为 $\triangle AEC$ 的中位线,

所以 $AE \parallel OF$, 又 $OF \subset$ 平面 BDF , $AE \not\subset$ 平面 BDF ,

所以 $AE \parallel$ 平面 BDF .

(2) 过 C 作 BE 的垂线, 垂足为 M , 即 $CM \perp BE$; 因为三角形 BCE 为锐角三角形, 所以 CM 与 CB 不重合, 因为, 平面 $AEB \perp$ 平面 BCE , 平面 $AEB \cap$ 平面 $BCE = BE$, 且 $CM \perp BE$, $CM \subset$ 平面 BCE , 所以, $CM \perp$ 平面 AEB , 又 $AE \subset$ 平面 AEB , 所以 $CM \perp AE$, 又已知 $AE \perp BC$, $BC \cap CM = C$, $BC, CM \subset$ 平面 BCE ,

所以 $AE \perp$ 平面 BCE .

17.

解:(1)如图,过点 D 作 DD' 垂直线段 AB , 垂足为 D' .

在 $\triangle ABC$ 中,因为 $AB \perp BC$, $\angle BAC = \frac{\pi}{6}$,

$AB=3$,所以 $BC=\sqrt{3}$.

因为 $DD' \perp AB$, $AB \perp BC$, $AB \parallel CD$,所以四边形 $BCDD'$ 是矩形,所以 $BD'=CD=2$, $DD'=BC=\sqrt{3}$.

在 $\text{Rt}\triangle ADD'$ 中, $AD'=1$, $DD'=\sqrt{3}$,所以 $AD=2$,则 $\sin \angle DAD' = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

故 $\angle DAD' = \frac{\pi}{3}$.

又 $\angle BAC = \frac{\pi}{6}$,所以 $\angle DAP = \frac{\pi}{6}$.

在 $\triangle ADP$ 中,由正弦定理得 $\frac{AD}{\sin \theta} = \frac{DP}{\sin \frac{\pi}{6}}$,

所以 $DP = \frac{1}{\sin \theta}$. 又点 P 在道路 AC 上(异于 A, C 两点),所以 $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{5\pi}{6}$,

所以 $DP = \frac{1}{\sin \theta}$ ($\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{5\pi}{6}$).

(2)在 $\triangle ADP$ 中,由正弦定理得 $\frac{AP}{\sin \angle ADP} = \frac{AD}{\sin \theta}$,

所以 $AP = \frac{2 \sin \angle ADP}{\sin \theta} = \frac{2 \sin(\frac{5\pi}{6} - \theta)}{\sin \theta}$,

所以 $S_{\triangle APD} = \frac{1}{2} AP \cdot PD \cdot \sin \theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \sin(\frac{5\pi}{6} - \theta)}{\sin \theta} \cdot \frac{1}{\sin \theta}$.

$\sin \theta = \frac{\sin(\frac{5\pi}{6} - \theta)}{\sin \theta}$, $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{5\pi}{6}$.

又 $S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} AD \cdot DC \cdot \sin \angle ADC = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \sin \frac{2\pi}{3} = \sqrt{3}$,

所以 $S_{\triangle DPC} = S_{\triangle ADC} - S_{\triangle APD} = \sqrt{3} - \frac{\sin(\frac{5\pi}{6} - \theta)}{\sin \theta}$, $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{5\pi}{6}$.

设所求的三项成本的总和为 $f(\theta)$,

则 $f(\theta) = \frac{\sin(\frac{5\pi}{6} - \theta)}{\sin \theta} \times 2 + (\sqrt{3} - \frac{\sin(\frac{5\pi}{6} - \theta)}{\sin \theta}) \times 1 + \frac{1}{\sin \theta} \times 1$

$= \sqrt{3} + \frac{\sin(\frac{5\pi}{6} - \theta) + 1}{\sin \theta}$

$= \frac{1}{2} \frac{\cos \theta + 1}{\sin \theta} + \frac{3\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{5\pi}{6}$,

所以 $f'(\theta) = \frac{-\frac{1}{2} - \cos \theta}{\sin^2 \theta}$, 令 $f'(\theta) = 0$, 则 $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

当 θ 变化时, $f(\theta)$ 与 $f'(\theta)$ 的变化情况如表所示:

θ	$(\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3})$	$\frac{2\pi}{3}$	$(\frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6})$
$f'(\theta)$	-	0	+
$f(\theta)$	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

所以当 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 时, $f(\theta)_{\min} = 2\sqrt{3}$.

故所求的三项成本的总和的最小值为 $2\sqrt{3}$ 万元.

18. (1) 因为点 $P(0,2)$ 关于直线 $y=-x$ 的对称点为 $(-2,0)$, 且 $(-2,0)$ 在椭圆 M 上, 所以 $a=2$. 又 $2c=2\sqrt{3}$, 故 $c=\sqrt{3}$, 则 $b^2=a^2-c^2=4-3=1$. 所以椭圆 M 的方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$.

(2) ①当直线 l 的斜率不存在时, $C(0,1), D(0,-1)$, 所以 $\overline{OC} \cdot \overline{OD} = -1$. 当直线 l 的斜率存在时, 设直线 l 的方程为 $y=kx+2, C(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$,
$$\begin{cases} y=kx+2, \\ \frac{x^2}{4}+y^2=1, \end{cases}$$
 消去 y 整理得 $(1+4k^2)x^2+16kx+12=0$,

由 $\Delta > 0$, 可得 $4k^2 > 3$, 且 $x_1+x_2 = -\frac{16k}{1+4k^2}, x_1x_2 = \frac{12}{1+4k^2}$, 所以 $\overline{OC} \cdot \overline{OD} = x_1x_2 + y_1y_2 = (1+k^2)x_1x_2 + 2k(x_1+x_2) + 4 = -1 + \frac{17}{1+4k^2}$, 所以 $-1 < \overline{OC} \cdot \overline{OD} < \frac{13}{4}$, 综上 $\overline{OC} \cdot \overline{OD} \in [-1, \frac{13}{4})$.

②由题意得, $AD: y = \frac{y_2-1}{x_2}x+1, BC: y = \frac{y_1+1}{x_1}x-1$, 联立方程组, 消去 x 得 $y = \frac{2kx_1x_2+x_1+3x_2}{3x_2-x_1}$, 又 $4kx_1x_2 = -3(x_1+x_2)$, 解得 $y = -\frac{1}{2}$, 故点 Q 的纵坐标为定值 $\frac{1}{2}$.

19. (1) 由题意知曲线 $y=f(x)$ 过点 $(1,0)$, 且 $f'(1)=e$; 又因为 $f'(x) = e^x \left(a \ln x - \frac{2}{x^2} + \frac{a+2}{x} + b \right)$,

则有 $\begin{cases} f(1) = e(2+b) = 0, \\ f'(1) = e(a+b) = e, \end{cases}$ 解得 $a=3, b=-2$. (2) ①当 $a=-2$ 时, 函数 $y=f(x)$ 的导函数

$f'(x) = e^x \left(-2 \ln x - \frac{2}{x^2} + b \right) = 0$, 若 $f'(x) = 0$ 时, 得 $b = 2 \ln x + \frac{2}{x^2}$, 设 $g(x) = 2 \ln x + \frac{2}{x^2} (x > 0)$.

由 $g'(x) = \frac{2}{x} - \frac{4}{x^3} = \frac{2x^2-4}{x^3} = 0$, 得 $x = \sqrt{2}$, $g(\sqrt{2}) = 1 + \ln 2$. 当 $0 < x < \sqrt{2}$ 时, $g'(x) < 0$,

函数 $y=g(x)$ 在区间 $(0, \sqrt{2})$ 上为减函数, $g(x) \in (1 + \ln 2, +\infty)$; 当 $x > \sqrt{2}$ 时, $g'(x) > 0$, 函数

$y=g(x)$ 在区间 $(\sqrt{2}, +\infty)$ 上为增函数, $g(x) \in (1 + \ln 2, +\infty)$; 所以, 当且仅当 $b > 1 + \ln 2$ 时,

$b=g(x)$ 有两个不同的解, 设为 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$.

x	$(0, x_1)$	x_1	(x_1, x_2)	x_2	$(x_2, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↘	极大值	↗	极小值	↘

此时, 函数 $y=f(x)$ 既有极大值, 又有极小值.

②由题意 $e^x \left(a \ln x + \frac{2}{x} + b \right) \geq kx$ 对一切正实数 x 恒成立, 取 $x=1$ 得 $k \leq (2+b)e$. 下证

$e^x \left(a \ln x + \frac{2}{x} + b \right) \geq (2+b)x$ 对一切正实数 x 恒成立. 首先, 证明 $e^x \geq ex$. 设函数 $u(x) = e^x - ex$,

则 $u'(x) = e^x - e$, 当 $x > 1$ 时, $u'(x) > 0$; 当 $x < 1$ 时, $u'(x) < 0$; 得 $e^x - ex \geq u(1) = 0$, 即 $e^x \geq ex$,

当且仅当都在 $x=1$ 处取到等号. 再证 $\ln x + \frac{1}{x} \geq 1$. 设 $v(x) = \ln x + \frac{1}{x} - 1$, 则 $v'(x) = \frac{x-1}{x^2}$, 当 $x > 1$ 时, $v'(x) > 0$; 当 $x < 1$ 时, $v'(x) < 0$; 得 $v(x) \geq v(1) = 0$, 即 $\ln x + \frac{1}{x} \geq 1$, 当且仅当都在 $x=1$ 处取到等号.

由上可得 $e^x \left(a \ln x + \frac{2}{x} + b \right) \geq (2+b)e^x$, 所以 $\left(\frac{f(x)}{x} \right)_{\min} = (2+b)e$, 即实数 k 的最大值为

$(2+b)e$.

20. 解 (1) 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都为递增数列, $\therefore a_{n+1} - a_n = 2, b_2 = -2b_1, b_{n+2} = 2b_{n+1}, n \in N^*$,

$$\therefore a_n = 2n - 1,$$

$$b_n = \begin{cases} -1 & n=1, \\ 2^{n-1} & n \geq 2. \end{cases}$$

(2) ① $\therefore$ 数列 $\{a_n\}$ 满足: 存在唯一的正整数 $k=5$, 使得 $a_k < a_{k-1}$, 且 $|a_{n+1} - a_n| = 2$,

$\therefore$ 数列 $\{a_n\}$ 必为 $1, 3, 5, 7, 5, 7, 9, 11, \dots$, 即前 4 项为首项为 1, 公差为 2 的等差数列, 从第 5 项开始为首项 5, 公差为 2 的等差数列,

$$\text{故 } S_n = \begin{cases} n^2, & n \leq 4, \\ n^2 - 4n + 15, & n \geq 5. \end{cases}$$

② $\therefore b_{n+1}^2 = 4b_n^2$, 即 $b_{n+1} = \pm 2b_n$, $\therefore |b_n| = 2^{n-1}$.

而数列 $\{b_n\}$ 为“ q 坠点数列”且 $b_1 = -1$, $\therefore$ 数列 $\{b_n\}$ 中有且只有两个负项.

假设存在正整数 m , 使得 $S_{m+1} = T_m$, 显然 $m \neq 1$, 且 T_m 为奇数, 而 $\{a_n\}$ 中各项均为奇数,

$\therefore m$ 必为偶数.

$$S_{m+1} \leq 1 + 3 + \dots + (2m+1) = (m+1)^2$$

i. 当 $q > m$ 时, $T_m = -1 + 2^1 + \dots + 2^{m-2} + 2^{m-1} = 2^m - 3$

当 $m \geq 6$ 时, $2^m - 3 > (m+1)^2$, 故不存在 m , 使得 $S_{m+1} = T_m$ 成立.

ii. 当 $q = m$ 时, $T_m = -1 + 2^1 + \dots + 2^{m-2} - 2^{m-1} = -3 < 0$,

显然不存在 m , 使得 $S_{m+1} = T_m$ 成立.

iii. 当 $q < m$ 时, $T_m \geq -1 + 2^1 + \dots + (2^{m-3}) + (-2^{m-2}) + 2^{m-1} = 2^{m-1} - 3$,

当 $2^{m-1} - 3 \leq (m+1)^2$ 时, 才存在 m , 使得 $S_{m+1} = T_m$ 成立, 所以 $m \leq 6$.

当 $m = 6$ 时, $q < 6$, 构造: $\{a_n\}$ 为 $1, 3, 1, 3, 5, 7, 9, \dots$, $\{b_n\}$ 为 $-1, 2, 4, 8, -16, 32, \dots$

此时 $p = 3, q = 5$, 所以 m 的最大值为 6.

2019 届高三下学期数学周末限时训练 3 参考答案 (附加题)

21. 解: (1) 由题意, 反射变换对应的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$,

旋转变换对应的矩阵为 $B = \begin{bmatrix} \cos(-90^\circ) & -\sin(-90^\circ) \\ \sin(-90^\circ) & \cos(-90^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

(2) 在曲线 C 上任取一点 (x, y) , 在 T_M 作用下对应点为 (x', y') , 即

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y \\ -x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}, \text{ 则 } \begin{cases} x' = -y \\ y' = -x \end{cases}, \text{ 又 } y^2 = 2x, \text{ 所以 } x'^2 = -2y'$$

即曲线 C' 的方程为: $x'^2 = -2y'$.

22. 解: 圆 C 的参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ y = \frac{4t}{1+t^2} \end{cases}$ 变形为 $\begin{cases} x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ \frac{y}{4} = \frac{t}{1+t^2} \end{cases}$, 两式平方后相加可得椭圆 C 的普通方程, 再

与直线 l 的普通方程 $y = x$ 联立可得 A, B 点的坐标, 利用两点间距离公式可得线段 AB 的长.

试题解析: 由已知, 椭圆 C 的普通方程为: $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$, 直线 l 的普通方程为: $y = x$,

$$\text{联立 } \begin{cases} x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 \\ y = x \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x = \frac{2\sqrt{5}}{5} \\ y = \frac{2\sqrt{5}}{5} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = -\frac{2\sqrt{5}}{5} \\ y = -\frac{2\sqrt{5}}{5} \end{cases}; \text{ 所以 } AB = \sqrt{\left(\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)^2 + \left(\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)^2} = \frac{4\sqrt{10}}{5}.$$

23. 解: (1) 设该单位购买的 3 辆汽车均为 B 种排量汽车为事件 M , 则 $P(M) = \frac{C_4^3}{C_{12}^3} = \frac{1}{55}$.

所以该单位购买的 3 辆汽车均为 B 种排量汽车的概率为 $\frac{1}{55}$4 分

(2) 随机变量 X 的所有可能取值为 1, 2, 3.

$$\text{则 } P(X=1) = \frac{C_5^3 + C_4^3 + C_3^3}{C_{12}^3} = \frac{3}{44}, P(X=3) = \frac{C_5^1 C_4^1 C_3^1}{C_{12}^3} = \frac{3}{11},$$

$$P(X=2) = 1 - P(X=1) - P(X=3) = \frac{29}{44}.$$

所以 X 的分布列为

X	1	2	3
P	$\frac{3}{44}$	$\frac{29}{44}$	$\frac{3}{11}$

.....8分

数学期望 $E(X) = 1 \times \frac{3}{44} + 2 \times \frac{29}{44} + 3 \times \frac{3}{11} = \frac{97}{44}$10分

24. 解: (1) $\begin{cases} y = 2x - 4 \\ y^2 = 4x \end{cases} \Rightarrow A(4, 4), B(1, -2)$, 设 $A_1(\frac{m^2}{4}, m), B_1(\frac{n^2}{4}, n)$,

$$k_{AT} = k_{A_1T} \Rightarrow \frac{4}{4-t} = \frac{m}{\frac{m^2}{4}-t} \Rightarrow m^2 - 4t = 4m - tm \Rightarrow m(m-4) = t(4-m)$$

$$\Rightarrow m = -t \Rightarrow A_1(\frac{t^2}{4}, -t), \text{同理: } B_1(t^2, 2t) \Rightarrow k = \frac{3t}{t^2 - \frac{t^2}{4}} = \frac{4}{t} \Rightarrow kt = 4 \text{定值.} \dots 5 \text{分}$$

(2) A_1B_1 : $y - 2t = \frac{4}{t}(x - t^2)$, 令 $y = 0$ 得 $N(\frac{t^2}{2}, 0)$, 而 $M(2, 0)$

$$\frac{S_1}{S_2} = \left| \frac{y_A}{y_B} \right| = 2 \Rightarrow S_2 = \frac{1}{2} S_1, \quad \frac{S_4}{S_1} = \left| \frac{TN \cdot y_{A_1}}{TM \cdot y_A} \right| = \left| \frac{\frac{t^2}{2} - t}{t-2} \cdot \frac{t}{4} \right| = \frac{t^2}{8} \Rightarrow S_4 = \frac{t^2}{8} S_1$$

$$\frac{S_3}{S_1} = \left| \frac{TN \cdot y_{B_1}}{TM \cdot y_A} \right| = \left| \frac{\frac{t}{2}(t-2)}{t-2} \cdot \frac{2t}{4} \right| = \frac{t^2}{4} \Rightarrow S_3 = \frac{t^2}{4} S_1$$

S_1, S_2, S_3, S_4 构成的等比数列, $\therefore t^2 = 1$ 而 $t > 0 \Rightarrow t = 1$10分