小专题：圆锥曲线中的定点、定值问题

思维导读：本讲是圆锥曲线的综合问题，难度较大。

了解碰到定点定值问题时一般的处理方法. 虽然本质上还是直线与圆锥曲线、韦达定理的应用, 但是在处理的技巧上需要细细琢磨. 选择合适的参数, 并利用参数得到有关的曲线方程或函数关系式是解决问题的关键, 尽量让计算量在可控的范围内. 常用的处理方法有两种:

- ①从特殊入手, 先求出定点或定值等, 再证明这个点或值与参数无关;
- ②直接推理, 计算, 并在计算过程中消去参数, 从而得到定点或定值.

考点 1: 圆锥曲线中的定值问题

在几何问题中, 有些几何量与参数无关, 这就构成定值问题. 求解这类问题的基本策略是“大处着眼、小处着手”, 从整体上把握问题给出的综合信息和处理问题的方法, 并恰当地运用待定系数法、相关点法、定义法等基本数学方法. 若题设中未告知定值, 可考虑用特殊化方法探求定值的可能值, 再证明之. 若已告知, 可设参数 (有时甚至要设两个参数), 运算推理到最后, 参数必须消去.

考点 2: 直线过定点的问题

如果满足一定条件的曲线系恒过某一点, 就是定点问题. 直线过定点问题的求解方法一般是先求出直线的方程 (含参数), 再由直线恒过定点的证明方法来求解.

例题讲解

例 1、已知 B_1, B_2 分别是中心在原点, 焦点在 x 轴上的椭圆 C 的上、下顶点, F 是 C 的右焦

点, $FB_1=2$, F 到直线 $x = -\frac{a^2}{c}$ 的距离是 $\frac{7\sqrt{3}}{3}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 点 P 是椭圆 C 上与 B_1, B_2 不重合的动点, 直线 B_1P, B_2P 与 x 轴分别交于点 M, N .

求证: $\vec{OM} \cdot \vec{ON}$ 是定值.

例 2. 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两焦点分别为 $F_1(-\sqrt{3}, 0)$, $F_2(\sqrt{3}, 0)$, 且经过点 $(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$.

(1) 求椭圆的方程及离心率;

(2) 设点 B, C, D 是椭圆上不同于椭圆顶点的三点, 点 B 与点 D 关于原点 O 对称. 设直线 CD, CB, OB, OC 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3, k_4 , 且 $k_1 k_2 = k_3 k_4$.

① $k_1 k_2$ 的值; ② 求 $OB^2 + OC^2$ 的值.

(第 2 题)

例 3. 已知椭圆 C 的中心在坐标原点, 焦点在 x 轴上, 椭圆 C 上的点到焦点距离的最大值为 3, 最小值为 1.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 若直线 $l: y = kx + m$ 与椭圆 C 相交于 A, B 两点 (A, B 不是左右顶点), 且以 AB 为直径的圆过椭圆 C 的右顶点, 求证: 直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.

巩固练习:

1、如图，椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 经过点 $A(0, -1)$ ，且离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 经过点 $(1, 1)$ ，且斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 P, Q (均异于点 A)，证明：直线 AP 与 AQ 的斜率之和为 2。

2、如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，焦点到相应准线的距离为 1。

(1) 求椭圆的标准方程；

(2) 若 P 为椭圆上的一点，过点 O 作 OP 的垂线交直线 $y = \sqrt{2}$ 于点 Q ，求 $\frac{1}{OP^2} + \frac{1}{OQ^2}$ 的值。

(第 17 题)

- 3、如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的焦距为 2，且过点 $(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{6}}{2})$. (1) 求椭圆 E 的方程；(2) 若点 A, B 分别是椭圆 E 的左、右顶点，直线 l 经过点 B 且垂直于 x 轴，点 P 是椭圆上异于 A, B 的任意一点，直线 AP 交 l 于点 M .
- (i) 设直线 OM 的斜率为 k_1 , 直线 BP 的斜率为 k_2 , 求证: $k_1 k_2$ 为定值;
- (ii) 设过点 M 垂直于 PB 的直线为 m , 求证: 直线 m 过定点, 并求出定点的坐标.

答案

1、解 (1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 由已知得, $FB_1 = a = 2$, $c + \frac{a^2}{c} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$, 所以 $a = 2$, $c = \sqrt{3}$, $b = 1$. 所以所求的椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. (2) 设 $P(x_0, y_0) (x_0 \neq 0)$, 直线 B_1P : $\frac{y+1}{y_0+1} = \frac{x}{x_0}$. 令 $y=0$ 得 $x = \frac{x_0}{y_0+1}$, 即 $M(\frac{x_0}{y_0+1}, 0)$. 直线 B_2P : $\frac{y-1}{y_0-1} = \frac{x}{x_0}$, 令 $y=0$ 得 $x = -\frac{x_0}{y_0-1}$, 即 $N(-\frac{x_0}{y_0-1}, 0)$ 所以 $\vec{OM} \cdot \vec{ON} = -\frac{x_0^2}{y_0^2-1}$. 因为 $\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1$, 所以 $1 - y_0^2 = \frac{x_0^2}{4}$, 所以 $\vec{OM} \cdot \vec{ON} = -\frac{x_0^2}{y_0^2-1} = 4$. 即 $\vec{OM} \cdot \vec{ON}$ 为定值

2、解: (1) 方法一依题意, $c = \sqrt{3}$, $a^2 = b^2 + 3$, 由 $\frac{3}{b^2+3} + \frac{1}{b^2} = 1$,

解得 $b^2 = 1 (b^2 = -\frac{3}{4}, \text{不合, 舍去})$, 从而 $a^2 = 4$. 故所求椭圆方程为: $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. 离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

方法 2: 由椭圆的定义知, $2a = \sqrt{(-\sqrt{3}-\sqrt{3})^2 + (0-\frac{1}{2})^2} + \sqrt{(\sqrt{3}-\sqrt{3})^2 + (0-\frac{1}{2})^2} = 4$, 即 $a = 2$.

下略.

(2) ① 设 $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$, 则 $D(-x_1, -y_1)$, 于是 $k_1 k_2 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot \frac{y_2 + y_1}{x_2 + x_1} = \frac{y_2^2 - y_1^2}{x_2^2 - x_1^2} =$

$$\frac{(1 - \frac{x_2^2}{4}) - (1 - \frac{x_1^2}{4})}{x_2^2 - x_1^2} = -\frac{1}{4}.$$

② 方法一由①知, $k_3 k_4 = k_1 k_2 = -\frac{1}{4}$, 故 $x_1 x_2 = -4y_1 y_2$.

所以, $(x_1 x_2)^2 = (-4y_1 y_2)^2$, 即 $(x_1 x_2)^2 = 16(1 - \frac{x_1^2}{4})(1 - \frac{x_2^2}{4}) = 16 - 4(x_1^2 + x_2^2) + x_1^2 x_2^2$, 所以, $x_1^2 + x_2^2 = 4$.

又 $2 = (\frac{x_1^2}{4} + y_1^2) + (\frac{x_2^2}{4} + y_2^2) = \frac{x_1^2 + x_2^2}{4} + y_1^2 + y_2^2$, 故 $y_1^2 + y_2^2 = 1$. 所以, $OB^2 + OC^2 = x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 = 5$.

3、解: 如图, 由题意设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$,

$$\text{由题设知, 得 } \begin{cases} a + c = 3, \\ a - c = 1, \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} a=2, \\ c=1, \end{cases} \text{ 则 } b^2=3.$$

所以椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 方法 1:

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

$$\text{由 } \begin{cases} y=kx+m, \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases} \text{ 消去 } y, \text{ 得}$$

$$(3+4k^2)x^2 + 8mkx + 4(m^2-3) = 0,$$

$\Delta = 64m^2k^2 - 16(3+4k^2)(m^2-3) > 0$, 即 $3+4k^2 - m^2 > 0$. 由根与系数的关系, 得

$$x_1 + x_2 = -\frac{8mk}{3+4k^2}, \quad \textcircled{1}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{4(m^2-3)}{3+4k^2}. \quad \textcircled{2}$$

$$\text{所以 } y_1 \cdot y_2 = (kx_1+m) \cdot (kx_2+m) = k^2x_1x_2 + mk(x_1+x_2) + m^2 = \frac{3(m^2-4k^2)}{3+4k^2}. \quad \textcircled{3}$$

以 AB 为直径的圆过椭圆的右顶点 $D(2, 0)$, 所以 $DA \perp DB$, 即 $k_{AD} \cdot k_{BD} = -1$,

所以 $\frac{y_1}{x_1-2} \cdot \frac{y_2}{x_2-2} = -1$, 化简得 $y_1y_2 + x_1x_2 - 2(x_1+x_2) + 4 = 0$,

$$\text{将 } \textcircled{1}\textcircled{2}\textcircled{3} \text{ 代入上式, 得 } \frac{3(m^2-4k^2)}{3+4k^2} + \frac{4(m^2-3)}{3+4k^2} + \frac{16mk}{3+4k^2} + 4 = 0,$$

整理得 $7m^2 + 16mk + 4k^2 = 0$, 解得 $m_1 = -2k$, $m_2 = -\frac{2k}{7}$, 且满足 $3+4k^2 - m^2 > 0$.

当 $m = -2k$ 时, 直线 $l: y = k(x-2)$, 过定点 $(2, 0)$.

$\therefore (2, 0)$ 是椭圆的右顶点, 且 l 不过椭圆的右顶点, $\therefore$ 定点 $(2, 0)$ 舍

当 $m = -\frac{2k}{7}$ 时, 直线 $l: y = k\left(x - \frac{2}{7}\right)$, 过定点 $\left(\frac{2}{7}, 0\right)$.

综上所述, 直线 l 过定点, 定点坐标为 $\left(\frac{2}{7}, 0\right)$

方法 2:

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 因为椭圆的右顶点为 $D(2, 0)$,

则可设直线 AD 方程为 $y = k_1(x-2)$.

将 $y = k_1(x-2)$ 代入椭圆方程, 并整理得 $(3+4k_1^2)x^2 - 16k_1^2x + 16k_1^2 - 12 = 0$,

$\textcircled{4}$

显然 2 与 x_1 是方程 $\textcircled{4}$ 的两个根,

$$\text{所以 } x_1 + 2 = \frac{16k_1^2}{3+4k_1^2}, \text{ 即 } x_1 = \frac{8k_1^2-6}{3+4k_1^2}, \text{ 所以 } y_1 = k_1(x_1-2) = \frac{-12k_1}{3+4k_1^2},$$

因为 $AD \perp BD$, 且 BD 也过右顶点 $D(2, 0)$

$$\text{所以, 用 } -\frac{1}{k_1} \text{ 替换上式中的 } k_1, \text{ 即得 } x_2 = \frac{8-6k_1^2}{4+3k_1^2}, y_2 = \frac{12k_1}{4+3k_1^2}.$$

设直线 AB 与 x 轴交于点 $M(a, 0)$, 并设 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$, 即

$$\left(a - \frac{8k_1^2-6}{3+4k_1^2}, \frac{12k_1}{3+4k_1^2}\right) = \lambda \left(\frac{8-6k_1^2}{4+3k_1^2} - a, \frac{12k_1}{4+3k_1^2}\right),$$

$$\text{所以 } \begin{cases} \frac{12k_1}{3+4k_1^2} = \lambda \frac{12k_1}{4+3k_1^2}, \\ a - \frac{8k_1^2-6}{3+4k_1^2} = \lambda \left(\frac{8-6k_1^2}{4+3k_1^2} - a \right). \end{cases}$$

消去 λ , 得 $a(3+4k_1^2) - (8k_1^2-6) = 8-6k_1^2 - a \cdot (4+3k_1^2)$, 解得 $a = \frac{2}{7}$.

所以, 直线 l 过定点, 定点坐标为 $\left(\frac{2}{7}, 0\right)$,

巩固练习

1、1)解 由题设知 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $b=1$,

结合 $a^2 = b^2 + c^2$, 解得 $a = \sqrt{2}$. 所以椭圆的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$.

(2)证明 由题设知, 直线 PQ 的方程为 $y = k(x-1) + 1 (k \neq 2)$, 代入 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$,

得 $(1+2k^2)x^2 - 4k(k-1)x + 2k(k-2) = 0$.

由已知 $\Delta = [-4k(k-1)]^2 - 4(1+2k^2) \cdot 2k(k-2) > 0$, 得 $k < -2$ 或 $k > 0$ 且 $k \neq 2$,

设 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$,

则 $x_1 + x_2 = \frac{4k(k-1)}{1+2k^2}$, $x_1 x_2 = \frac{2k(k-2)}{1+2k^2}$.

从而直线 AP , AQ 的斜率之和

$$\begin{aligned} k_{AP} + k_{AQ} &= \frac{y_1+1}{x_1} + \frac{y_2+1}{x_2} = \frac{kx_1+2-k}{x_1} + \frac{kx_2+2-k}{x_2} \\ &= 2k + (2-k) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right) = 2k + (2-k) \frac{x_1+x_2}{x_1 x_2} \\ &= 2k + (2-k) \frac{4k(k-1)}{2k(k-2)} = 2k - 2(k-1) = 2. \end{aligned}$$

所以直线 AP 与 AQ 的斜率之和为定值 2.

2、【解】(1) 由题意得, $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{a^2}{c} - c = 1$, 解得 $a = \sqrt{2}$, $c = 1$, $b = 1$.

所以椭圆的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$.

(2) 由题意知 OP 的斜率存在.

当 OP 的斜率为 0 时, $OP = \sqrt{2}$, $OQ = \sqrt{2}$, 所以 $\frac{1}{OP^2} + \frac{1}{OQ^2} = 1$.

当 OP 的斜率不为 0 时, 设直线 OP 方程为 $y = kx$.

$$\text{由 } \begin{cases} \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \\ y = kx, \end{cases} \text{ 得 } (2k^2 + 1)x^2 = 2, \text{ 解得 } x^2 = \frac{2}{2k^2 + 1}, \text{ 所以 } y^2 = \frac{2k^2}{2k^2 + 1},$$

所以 $OP^2 = \frac{2k^2 + 2}{2k^2 + 1}$. 因为 $OP \perp OQ$, 所以直线 OQ 的方程为 $y = -\frac{1}{k}x$.

$$\text{由 } \begin{cases} y = \sqrt{2}, \\ y = -\frac{1}{k}x \end{cases} \text{ 得 } x = -\sqrt{2}k, \text{ 所以 } OQ^2 = 2k^2 + 2.$$

所以 $\frac{1}{OP^2} + \frac{1}{OQ^2} = \frac{2k^2 + 1}{2k^2 + 2} + \frac{1}{2k^2 + 2} = 1$. 综上, 可知 $\frac{1}{OP^2} + \frac{1}{OQ^2} = 1$.

3、(1)由题意得 $2c = 2$, 所以 $c = 1$, 又 $\frac{2}{a^2} + \frac{3}{2b^2} = 1$, 消去 a 可得, $2b^4 - 5b^2 - 3 = 0$, 解得 $b^2 = 3$ 或 $b^2 = -\frac{1}{2}$ (舍去), 则 $a^2 = 4$, 所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) (i) 设 $P(x_1, y_1) (y_1 \neq 0)$, $M(2, y_0)$, 则 $k_1 = \frac{y_0}{2}$, $k_2 = \frac{y_1}{x_1 - 2}$,

因为 A, P, B 三点共线, 所以 $y_0 = \frac{4y_1}{x_1 + 2}$, 所以, $k_1 k_2 = \frac{y_0 y_1}{2(x_1 - 2)} = \frac{4y_1^2}{2(x_1^2 - 4)}$, 8分

因为 $P(x_1, y_1)$ 在椭圆上, 所以 $y_1^2 = \frac{3}{4}(4 - x_1^2)$, 故 $k_1 k_2 = \frac{4y_1^2}{2(x_1^2 - 4)} = -\frac{3}{2}$ 为定值. 10分

(ii) 直线 BP 的斜率为 $k_2 = \frac{y_1}{x_1 - 2}$, 直线 m 的斜率为 $k_m = \frac{2 - x_1}{y_1}$, 则直线 m 的方程为

$$y - y_0 = \frac{2 - x_1}{y_1}(x - 2),$$

$$y = \frac{2 - x_1}{y_1}(x - 2) + y_0 = \frac{2 - x_1}{y_1}x - \frac{2(2 - x_1)}{y_1} + \frac{4y_1}{x_1 + 2} = \frac{2 - x_1}{y_1}x + \frac{2(x_1^2 - 4) + 4y_1^2}{(x_1 + 2)y_1}$$

$$= \frac{2 - x_1}{y_1}x + \frac{2(x_1^2 - 4) + 12 - 3x_1^2}{(x_1 + 2)y_1} = \frac{2 - x_1}{y_1}x + \frac{2 - x_1}{y_1} = \frac{2 - x_1}{y_1}(x + 1), \text{ 所以直线 } m \text{ 过定点}$$