关于“伪中点弦”的思考

扬州中学 225000 戚有建

1 问题的提出

题目 经过点 $P(1, 1)$ 的直线 l 和双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ 交于 A, B 两点, 并且 P 是弦 AB 的中点, 问直线 l 是否存在, 如果存在, 求出直线 l 的方程; 如果不存在, 说明理由.

对于这道题, 我们都非常熟悉, 可以用点差法来处理, 解题过程如下:

解 当直线 l 的斜率不存在时, 显然不满足要求;

当直线 l 的斜率存在时, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ (其中 $x_1 \neq x_2$), 则 $x_1^2 - \frac{y_1^2}{2} = 1, x_2^2 - \frac{y_2^2}{2} = 1$, 两式相减得到 $x_2^2 - x_1^2 = \frac{y_2^2 - y_1^2}{2}$, 即 $\frac{y_2 + y_1}{x_2 + x_1} \cdot \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = 2$, 即 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2(x_2 + x_1)}{y_2 + y_1}$.

因为点 $P(1, 1)$ 是弦 AB 的中点, 所以 $x_2 + x_1 = 2, y_2 + y_1 = 2$, 所以 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = 2$, 即 $k_{AB} = 2$, 因此直线 l 的方程为 $y = 2x - 1$.

下面检验判别式 Δ , 将 $y = 2x - 1$ 代入 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ 得 $2x^2 - 4x + 3 = 0$, 因为 $\Delta = -8 < 0$, 所以直线 l 不存在.

应该说用“点差法”来处理本题思路清晰, 过程简洁(设而不求), 但美中不足的是求得的直线却是“增根”(我们不妨称其为“伪中点弦”), 这让我们感到有些遗憾, 同时也让我们充满疑问: 为什么用“点差法”求解的过程中会产生“伪中点弦”? “伪中点弦” $y = 2x - 1$ 的“真主人”是谁? “伪中点弦”有什么几何意义呢?

2 问题的思考

2.1 思考用“点差法”求解可能会产生“伪中点弦”的原因

实际上, 直线 l 是否存在 $\Leftrightarrow$ 方程组

$$\begin{cases} x_1^2 - \frac{y_1^2}{2} = 1 \\ x_2^2 - \frac{y_2^2}{2} = 1 \\ \frac{x_1 + x_2}{2} = 1 \\ \frac{y_1 + y_2}{2} = 1 \end{cases} \quad (\text{I}) \text{ 是否有解, 而在用“点差法”}$$

求解的过程中将要求降低了, 降低为方程组

$$\begin{cases} x_1^2 - \frac{y_1^2}{2} = x_2^2 - \frac{y_2^2}{2} \\ \frac{x_1 + x_2}{2} = 1 \\ \frac{y_1 + y_2}{2} = 1 \end{cases} \quad (\text{II}) \text{ 是否有解, 显然方程}$$

组 (I) 和方程组 (II) 并不等价, 方程组 (I) 的解一定满足方程组 (II), 但是方程组 (II) 的解不一定满足方程组 (I), 例如 $x_1 = 3, y_1 = 5, x_2 = -1, y_2 = -3$ 是方程组 (II) 的解, 但不是是方程组 (I) 的解. 所以用“点差法”求得的直线不一定是所需的中点弦, 前者只是后者的必要条件.

2.2 思考双曲线“伪中点弦”的“真主人”

虽然用“点差法”求得的直线 $y = 2x - 1$ 是双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ 的经过点 $P(1, 1)$ 的“伪中点弦”, 但是直线 $y = 2x - 1$ 肯定也有其“道理”, 那么直线 $y = 2x - 1$ 是怎样的双曲线的经过点 $P(1, 1)$ 的“真中点弦”呢?

实际上, 由上面的分析可以发现方程组

$$\begin{cases} x_1^2 - \frac{y_1^2}{2} = \lambda \\ x_2^2 - \frac{y_2^2}{2} = \lambda \\ \frac{x_1 + x_2}{2} = 1 \\ \frac{y_1 + y_2}{2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1^2 - \frac{y_1^2}{2} = \lambda \\ x_2^2 - \frac{y_2^2}{2} = \lambda \\ \frac{x_1 + x_2}{2} = 1 \\ \frac{y_1 + y_2}{2} = 1 \end{cases}$$

因此, 直线 $y = 2x - 1$ 应该与双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = \lambda$ ($\lambda \neq 0$) 有关,

下面检验判别式 Δ , 将 $y = 2x - 1$ 代入 $x^2 - \frac{y^2}{2} = \lambda$ ($\lambda \neq 0$) 得 $2x^2 - 4x + 2\lambda + 1 = 0$, 所以 $\Delta = 8 - 16\lambda$, 设 $\Delta = 8 - 16\lambda > 0$ 则 $\lambda < \frac{1}{2}$, 所以用“点差法”求得的“伪中点弦” $y = 2x - 1$ 的“真主人”是双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = \lambda$ ($\lambda < \frac{1}{2}$ 且 $\lambda \neq 0$).

推广 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) 及 $P(x_0, y_0)$, 其中 $0 < \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} < 1$ 则用“点差法”求得的“伪中点弦” $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}$ 的“真主人”是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \lambda$ ($\lambda \neq 0; \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} > 1$ 或 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} < 0$).

证明 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 则

$$\begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = \lambda \\ \frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = \lambda \\ \frac{x_1 + x_2}{2} = x_0 \\ \frac{y_1 + y_2}{2} = y_0 \end{cases}, \text{ 由“点差法”可得 } k_{AB} =$$

$\frac{b^2(x_1 + x_2)}{a^2(y_1 + y_2)} = \frac{b^2x_0}{a^2y_0}$, 于是得到直线 AB 的方程为 $y - y_0 = \frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x - x_0)$, 化简即 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}$,

下面检验判别式 Δ ,

$$\text{由 } \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \lambda \\ \frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} \end{cases} \text{ 得 } \left(\frac{y_0^2}{a^2b^2} - \frac{x_0^2}{a^4}\right)x^2 +$$

$$\frac{2x_0}{a^2}\left(\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}\right)x - \left(\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}\right)^2 - \frac{\lambda y_0^2}{b^2} = 0,$$

$$\text{所以 } \Delta = \left(\frac{2x_0}{a^2}\left(\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}\right)\right)^2 + 4\left(\frac{y_0^2}{a^2b^2} - \frac{x_0^2}{a^4}\right)$$

$$\left(\left(\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}\right)^2 + \frac{\lambda y_0^2}{b^2}\right) = \frac{4y_0^2}{a^2b^2}\left(\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}\right)\left(\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} - \lambda\right),$$

因为 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} > 1$ 或 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} < 0$

$$\text{所以 } \Delta = \frac{4y_0^2}{a^2b^2}\left(\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}\right)\left(\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} - \lambda\right)$$

$$= \frac{4y_0^2\lambda^2}{a^2b^2}\left(\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}\right)\left(\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} - 1\right) > 0, \text{ 所以“伪中点弦”}$$

$\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}$ 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \lambda$,

($\lambda \neq 0; \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} > 1$ 或 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} < 0$) 的经过点

$P(x_0, y_0)$ 的“真中点弦”.

2.3 类比思考椭圆、抛物线“伪中点弦”的“真主人”

关于椭圆, 可得如下结论:

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 及 $P(x_0, y_0)$,

其中 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1$ 则用“点差法”求得的“伪中点弦”

$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}$ 的“真主人”是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \lambda$,

($\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} < \lambda$). (注 不等式 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1$ 实际上表

明 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 外; 不

等式 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} < \lambda$ 表明 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} =$

λ ($\lambda > 0$) 内部)

同理, 关于抛物线, 有如下结论:

已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 及 $P(x_0, y_0)$, 其中 $y_0^2 > 2px_0$, 则用“点差法”求得的“伪中点弦” $y_0y - p(x + x_0) = y_0^2$ 的“真主人”是抛物线 $y^2 = 2px + \lambda$ ($p > 0, \lambda > y_0^2 - 2px_0$).

2.4 思考“伪中点弦”与“极线”的关系

不妨以椭圆为例.

设 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 外,

则用“点差法”可求得“伪中点弦”为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2}$

+ $\frac{y_0^2}{b^2}$, 另外点 $P(x_0, y_0)$ 关于椭圆的“极线”(切点

弦) 为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$, 由于两者结构很相似, 所以猜想“伪中点弦”与“极线”有关系, 研究后得到如下

结论:

设 $P(x_0, y_0)$ 关于椭圆的反演点为 Q 则“伪中点弦” $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}$ 即为 Q 关于椭圆的“极线”.

证明 因为 $Q(x_Q, y_Q)$ 关于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的“极线”为 $\frac{x_Qx}{a^2} + \frac{y_Qy}{b^2} = 1$,

又因为可求得 $P(x_0, y_0)$ 关于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的反演点 Q 的坐标为

$$Q \left(\frac{x_0}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}}, \frac{y_0}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}} \right),$$

所以 Q 关于椭圆的“极线”为

$$\frac{x_0}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}} \frac{x}{a^2} + \frac{y_0}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}} \frac{y}{b^2} = 1,$$

$$\text{化简得 } \frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2},$$

所以,“伪中点弦” $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}$ 即为 Q 关

于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的“极线”.

另外,对于双曲线、抛物线也有类似结论.

从视角最大到光时最短

——图说 Muller 问题、Schwarz 问题

安徽省肥东一中 231600 李剑峰

1 问题的起源

笔者在解答学生的疑惑中遇到如下问题:

问题 在 $\triangle ABC$ 中,边长 $a = 2, A = 60^\circ$,求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

问题本身叙述简单明了,图形简洁明快,解决方案也朴实常规, $S = \frac{1}{2}bc \sin A$,要求面积的最大值,只需考虑 bc 的最大值即可.

思路 1 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$,

$$\text{得 } bc = \frac{a^2}{\sin^2 A} \sin B \sin C,$$

$$\text{又 } \sin B \sin C = \sin B \sin(120^\circ - B)$$

$$= \frac{1}{2} [\cos(2B - 120^\circ) - \cos 120^\circ],$$

所以当 $B = 60^\circ$ 时取得最大值.

思路 2 由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$,

$$\text{得 } b^2 + c^2 - bc = 4,$$

又 $b^2 + c^2 - bc \geq 2bc - bc$,所以 $bc \leq 4$,当且仅当 $b = c$ 时取得最大值.

在问题解决后,笔者感觉到该问题设问简洁美、

思路流畅美、结果形式美,继而有思考之冲动,遂成此文.

2 问题的思考

思考 1 在 $\triangle ABC$ 中,边长 $a = 2, A = 60^\circ$,求 $\triangle ABC$ 周长的最大值.

事实上,只需求 $b + c$ 的最大值,解决方案同上述两种思路,此处略.

思考 2 在 $\triangle ABC$ 中,边长 $a = 2, A = 60^\circ$,求动点 A 的轨迹.

从图 1 不难得出如下

结论:在平面内动点 A 的轨迹是两段圆弧;在空间中动点 A 的轨迹成“苹果”状.该结论表明在过点 B, C 的同一圆弧上任意位置看 BC 的视角是相同的,利用该结论我们可以解决如下历史名题:

图 1

Muller 问题 [2] 在地球表面的什么部位,一根垂直的悬杆呈现最长(即可视角最大)?该问题在人教版必修 5 不等式章节中以习题呈现,米勒问题