$$\frac{2s[2(s^2 - 4Rr - r^2)^2 - 8s^2r^2] + 8Rrs(s^2 - 4Rr - r^2)}{2s(s^2 + 2Rr + r^2)} - \frac{s}{4Rrs}$$

$$\cdot [2s(s^2 - 6Rr - 3r^2) + \frac{2s[2s(s^2 - 6Rr - 3r^2)] + 8Rrs^2}{2s(s^2 + 2Rr + r^2)} =$$

$$s \cdot (\frac{1}{2Rr} \cdot \frac{s^4 - 6s^2r^2 + r^4 + 16R^2r^2 + 8Rr^3 - 8Rrs^2}{s^2 + 2Rr + r^2}$$

$$- \frac{s^2 - 6Rr - 3r^2}{2Rr} + \frac{3s^2 - 12Rr - 7r^2}{s^2 + 2Rr + r^2}) = s \cdot (1 - \frac{2r}{R} + \frac{r^2}{R} \cdot$$

$$\frac{4R + 4r}{s^2 + 2Rr + r^2} + \frac{2r^2}{s^2 + 2Rr + r^2}).$$

定理 1 的证明: 根据熟知的欧拉不等式 $R \geq 2r$ 可知 $18R^2 - 3Rr - 2r^2 \geq 16R^2 + 2R^2 - 3Rr - 2r^2 = 16R^2 + (R - 2r)(2R + r) \geq 16R^2$, 于是有 $18R^2 - 3Rr - 2r^2 \geq 16R^2$ ⑤. ⑤ 式等号成立当且仅当 $R = 2r$, 即 $\triangle ABC$ 为正三角形时成立.

由引理 2 和引理 4 与 ⑤ 式, 有 $\sum \frac{a^2}{b+c} \sin^2 \frac{A}{2} =$

$$s \cdot (1 - \frac{2r}{R} + \frac{r^2}{R} \cdot \frac{4R + 4r}{s^2 + 2Rr + r^2} + \frac{2r^2}{s^2 + 2Rr + r^2}) \leq$$

$$s \cdot [1 - \frac{2r}{R} + \frac{r^2}{R} \cdot \frac{4R + 4r}{\frac{2r(4R + r)(2R - r)}{R} + 2Rr + r^2} +$$

$$\frac{2r^2}{\frac{2r(4R + r)(2R - r)}{R} + 2Rr + r^2}] = s \cdot [1 - \frac{2r}{R} + \frac{r^2}{R}$$

$$\cdot \frac{R(4R + 4r)}{r(18R^2 - 3Rr - 2r^2)} + \frac{2Rr^2}{r(18R^2 - 3Rr - 2r^2)}] =$$

$$s \cdot [1 - \frac{2r}{R} + \frac{r(4R + 4r)}{18R^2 - 3Rr - 2r^2} + \frac{2Rr}{18R^2 - 3Rr - 2r^2}] =$$

$$s \cdot (1 - \frac{2r}{R} + \frac{6Rr + 4r^2}{18R^2 - 3Rr - 2r^2}) \leq s \cdot (1 - \frac{2r}{R} +$$

$$\frac{6Rr + 4r^2}{16R^2}) = s \cdot (1 - \frac{13r}{8R} + \frac{r^2}{4R^2}) \leq \frac{3\sqrt{3}R}{2} \cdot (1 - \frac{13r}{8R}$$

$$+ \frac{r^2}{4R^2}),$$

由引理 2 和引理 4 与 ⑤ 式等号成立的条件可知, 不等式 ③ 等号当且仅当 $\triangle ABC$ 为正三角形时成立.

定理 2 的证明: 根据熟知的欧拉不等式 $R \geq 2r$

可知 $4R^3 + 6R^2r + 3Rr^2 + 2r^3 \leq 4R^3 + 6R^2 \cdot \frac{R}{2} + 3R \cdot \frac{R^2}{4} + \frac{2R^3}{8} = 8R^3$, 于是有 $4R^3 + 6R^2r + 3Rr^2 + 2r^3 \leq 8R^3$ ⑥, ⑥ 式等号成立当且仅当 $R = 2r$, 即 $\triangle ABC$ 为正三角形时成立.

由引理 3 和引理 4 与 ⑥ 式有 $\sum \frac{a^2}{b+c} \sin^2 \frac{A}{2} =$

$$s \cdot (1 - \frac{2r}{R} + \frac{r^2}{R} \cdot \frac{4R + 4r}{s^2 + 2Rr + r^2} + \frac{2r^2}{s^2 + 2Rr + r^2}) \geq s \cdot$$

$$[1 - \frac{2r}{R} + \frac{r^2}{R} \cdot \frac{4R + 4r}{\frac{2(2R^2 + r^2)(R + r)}{R} + 2Rr + r^2} +$$

$$\frac{2r^2}{\frac{2(2R^2 + r^2)(R + r)}{R} + 2Rr + r^2}] = s \cdot$$

$$[1 - \frac{2r}{R} + \frac{r^2(4R + 4r)}{4R^3 + 6R^2r + 3Rr^2 + 2r^3} +$$

$$\frac{2Rr^2}{4R^3 + 6R^2r + 3Rr^2 + 2r^3}] \geq s \cdot [1 - \frac{2r}{R} + \frac{r^2(4R + 4r)}{8R^3}$$

$$+ \frac{2Rr^2}{8R^3}] = s \cdot (1 - \frac{2r}{R} + \frac{3r^2}{4R^2} + \frac{r^3}{2R^3}) \geq 3\sqrt{3}r \cdot (1 -$$

$$\frac{2r}{R} + \frac{3r^2}{4R^2} + \frac{r^3}{2R^3})$$

由引理 3 和引理 4 与 ⑥ 式等号成立的条件可知, 不等式 ④ 等号当且仅当 $\triangle ABC$ 为正三角形时成立.

参考文献

[1] 姜卫东. 关于 Milosevic 不等式的加强[J]. 中学数学教学, 2019(1): 71.
 [2] 匡继昌. 常用不等式(第四版)[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2010, 234.
 [3] 郭要红, 刘其右. 一个 Finsler - Hadwiger 型不等式的加强[J]. 数学通报, 2017, 56(1) 60 - 61.
 [4] 王洪燕, 郭要红. Finsler - Hadwiger 型不等式推广再研究[J]. 数学通报, 2019, 58(7) 54 - 55.
 [5] 郭要红, 关于 Milosevic 不等式的再研讨[J]. 数学通报, 2020, 59(2) 60 - 61.

一个圆锥曲线双斜率问题的统一解法

浙江省宁波市北仑中学 (315800) 吴文尧

在圆锥曲线的定点、定值问题中, 常涉及以下问题: 过圆锥曲线 T 上一定点 Q 作曲线 T 的两动弦 QA, QB , 若直线 QA, QB 的斜率积(和)为定值, 则直

线 AB 经过一个定点. 我们不妨称之为“双斜率”问题, 笔者研究发现解决这个问题的统一解法, 现介绍如下, 供大家参考.

一、引理和定理

引理 设 P_1, P_2 是曲线 $T: Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey = 0$ (其中 $A + C \neq 0$) 上的两个动点, O 为坐标原点, 直线 OP_1, OP_2 的斜率分别为 k_1, k_2 , 则

(1) 当 $k_1 \cdot k_2 = q$ (q 为定值, 其中 $Cq \neq A$) 时, 直线 P_1P_2 过定点 $\left(\frac{D}{Cq-A}, \frac{-Eq}{Cq-A}\right)$;

(2) 当 $k_1 + k_2 = p$ (p 为定值, 其中 $Cp \neq 0$), 直线 P_1P_2 过定点 $\left(-\frac{E}{pC}, -\frac{D+pE}{pC}\right)$.

证明: 设 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$, 设直线 P_1P_2 的方程为 $mx + ny = 1$, 由 $\begin{cases} Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey = 0, \\ mx + ny = 1 \end{cases}$

可得 $Ax^2 + Cy^2 + (Dx + Ey)(mx + ny) = 0$, 即 $(C + En)y^2 + (Dn + Em)xy + (A + Dm)x^2 = 0$, 所以 $(C + En)\left(\frac{y}{x}\right)^2 + (Dn + Em)\left(\frac{y}{x}\right) + (A + Dm) = 0$, 其中

$$k_1 = k_{OP_1} = \left(\frac{y_1}{x_1}\right), k_2 = k_{OP_2} = \left(\frac{y_2}{x_2}\right).$$

(1) 当 $k_1 \cdot k_2 = q$ 时, $k_1 \cdot k_2 = \left(\frac{y_1}{x_1}\right) \cdot \left(\frac{y_2}{x_2}\right) = \frac{A + Dm}{C + En} = q$, 即 $A + Dm = q(C + En)$, 所以 $Dm - qEn = qC - A$, 所以 $m \cdot \frac{D}{qC - A} + n \cdot \left(\frac{-Eq}{qC - A}\right) = 1$, 由于直线 P_1P_2 的方程为 $mx + ny = 1$, 所以直线 P_1P_2 过定点 $\left(\frac{D}{Cq - A}, \frac{-Eq}{Cq - A}\right)$.

(2) 当 $k_1 + k_2 = p$ 时, $k_1 + k_2 = \left(\frac{y_1}{x_1}\right) + \left(\frac{y_2}{x_2}\right) = -\frac{Dn + Em}{C + En} = p$, 即 $Dn + Em = -p(C + En)$, 所以 $mE + n(D + pE) = -pC$, 所以 $m \cdot \left(-\frac{E}{pC}\right) + n \cdot \left(-\frac{D + pE}{pC}\right) = 1$, 由于直线 P_1P_2 的方程为 $mx + ny = 1$, 所以直线 P_1P_2 过定点 $\left(-\frac{E}{pC}, -\frac{D + pE}{pC}\right)$.

定理 设 $Q(x_0, y_0)$ 是圆锥曲线 $T: Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 上的定点, P_1, P_2 是曲线 T 上的两个动点, 直线 QP_1, QP_2 的斜率分别为 k_1, k_2 , 则

(1) 当 $k_1 \cdot k_2 = q$ (q 为定值, 其中 $Cq \neq A$) 时, 直线 P_1P_2 过定点 $\left(\frac{D + (A + Cq)x_0}{Cq - A}, \frac{-Eq - (A + Cq)y_0}{Cq - A}\right)$;

(2) 当 $k_1 + k_2 = p$ (p 为定值, 其中 $Cp \neq 0$) 时, 直线 P_1P_2 过定点 $\left(-\frac{2Cy_0 - Cpx_0 + E}{pC}, -\frac{2Dx_0 + pCy_0 + D + pE}{pC}\right)$.

证明: 因为 $Q(x_0, y_0)$ 是曲线 T 上的点, 所以 Ax_0^2

$+ Cy_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F = 0$, 作坐标系的平移:

$\begin{cases} x = x' + x_0, \\ y = y' + y_0, \end{cases}$ 则在新坐标系 $x'o'y'$ 中, 点 Q 的坐标为 $Q(0, 0)$, 曲线 T 的方程为 $A(x' + x_0)^2 + C(y' + y_0)^2 + D(x' + x_0) + E(y' + y_0) + F = 0$, 即 $A(x')^2 + C(y')^2 + (2Ax_0 + D)x' + (2Cy_0 + E)y' = 0$.

(1) 当 $k_1 \cdot k_2 = q$ 时, 由引理可知, 直线 P_1P_2 过定点 $\left(\frac{D + 2Ax_0}{Cq - A}, \frac{-Eq - 2Cqy_0}{Cq - A}\right)$, 所以在原坐标系中, 直线 P_1P_2 过定点 $\left(\frac{D + 2Ax_0}{Cq - A} + x_0, \frac{-Eq - 2Cqy_0}{Cq - A} + y_0\right)$, 即直线 P_1P_2 过定点 $\left(\frac{D + (A + Cq)x_0}{Cq - A}, \frac{-Eq - (A + Cq)y_0}{Cq - A}\right)$.

(2) 当 $k_1 + k_2 = p$ 时, 由引理可知直线 P_1P_2 过定点 $\left(-\frac{2Cy_0 + E}{pC}, -\frac{2Ax_0 + D + p(2Cy_0 + E)}{pC}\right)$, 所以在原坐标系中, 直线 P_1P_2 过定点 $\left(-\frac{2Cy_0 + E}{pC} + x_0, -\frac{2Ax_0 + D + p(2Cy_0 + E)}{pC} + y_0\right)$, 即直线 P_1P_2 过定点 $\left(-\frac{2Cy_0 - Cpx_0 + E}{pC}, -\frac{2Ax_0 + pCy_0 + D + pE}{pC}\right)$.

二、应用举例

例 1 (2017 年高考全国 I 卷理科数学第 20 题第 (2) 小题) 设直线 l 不经过椭圆 $T: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的上顶点 P , 且与椭圆 T 相交于 A, B 两点, 若直线 PA, PB 的斜率分别为 k_1, k_2 , 且 $k_1 + k_2 = -1$, 求证: 直线 l 经过一个定点.

分析: 由于椭圆的方程为 $x^2 + 4y^2 - 4 = 0$, 点 $P(0, 1)$, 即 $A = 1, C = 4, D = E = 0, x_0 = 0, y_0 = 1, p = -1$, 由定理可知, 直线 AB 经过一个定点 $(2, -1)$, 若掌握引理及定理的证明方法, 则不难得到以下解法.

解答: 椭圆的方程为 $x^2 + 4y^2 - 4 = 0$, 其上顶点为 $P(0, 1)$, 作坐标系的平移: $\begin{cases} x = x', \\ y = y' + 1, \end{cases}$ 则在新坐标系 $x'o'y'$ 中, 点 P 的坐标为 $P(0, 0)$, 椭圆的方程为 $(x')^2 + 4(y')^2 + 8y' = 0$, 设直线 AB 的方程为 $mx' + ny' = 1$, 由 $\begin{cases} (x')^2 + 4(y')^2 + 8y' = 0, \\ mx' + ny' = 1 \end{cases}$ 可得 $(x')^2 + 4(y')^2 + 8y'(mx' + ny') = 0$, 即 $(4 + 8n) \cdot (y')^2 + 8my'x' + (x')^2 = 0$, 所以 $(4 + 8n)\left(\frac{y'}{x'}\right)^2 + 8m\left(\frac{y'}{x'}\right) + 1$

$= 0$, 设 $A(x'_1, y'_1), B(x'_2, y'_2)$, 则 $k_1 = \left(\frac{y'_1}{x'_1}\right), k_2 = \left(\frac{y'_2}{x'_2}\right)$, 所以 $k_1 + k_2 = \left(\frac{y'_1}{x'_1}\right) + \left(\frac{y'_2}{x'_2}\right) = \frac{-8m}{4+8n} = -1$, 所以 $m \cdot 2 + n \cdot (-2) = 1$, 因为直线 AB 的方程为 $mx' + ny' = 1$, 所以直线 AB 过定点 $T(2, -2)$. 所以在原坐标系中, 直线 AB 过定点 $T(2, -1)$.

评注:由本题的解法, 可总结得到解决这类问题的解题程序如下:

(1) 平移——作坐标系的平移, 使曲线 T 上的定点恰为新坐标系的原点. 曲线 T 的方程必是常数项为零的二元二次方程.

(2) 构造——在新坐标系中, 设目标直线的方程为 $mx' + ny' = 1$, 与曲线 T 的方程联立, 得到关于 x', y' 的齐次方程, 从而得到关于 $\frac{y'}{x'}$ 的一元二次方程.

(3) 使用——运用韦达定理及两动弦斜率的关系得到关于 m, n 的一个方程.

(4) 定点——由直线方程 $mx' + ny' = 1$ 结合 m, n 的关系式得到目标直线经过的定点在新坐标系中的坐标.

(5) 回归——利用坐标平移公式, 得到目标直线经过的定点在原坐标系中的坐标.

例 2 (2020 年高考山东数学卷第 22 题第 (2) 小题) 已知点 $A(2, 1)$ 是椭圆 $T: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上的定点, M, N 是椭圆 T 上的两动点, 且 $AM \perp AN, AD \perp MN, D$ 为垂足, 求证: 存在定点 Q , 使得 $|DQ|$ 为定值.

分析:由定理可知直线 MN 经过一个定点 P , 由于椭圆 T 的方程为 $x^2 + 2y^2 - 6 = 0$, 点 $A(2, 1)$, 即 $A = 1, C = 2, D = E = 0, x_0 = 2, y_0 = 1$, 又注意到 $AM \perp AN$, 所以 $k_1 \cdot k_2 = q = -1$, 由定理可得 $P\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$, $AD \perp MN$ 于 D 可知, 点 D 在以 AP 为直径的圆上, 故所求定点 Q 恰为 AP 的中点.

解答:椭圆的方程为 $x^2 + 2y^2 - 6 = 0$, 作坐标系的平移: $\begin{cases} x - 2 = x' \\ y - 1 = y' \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x = x' + 2 \\ y = y' + 1 \end{cases}$, 则在新坐标系 $x'o'y'$ 中, 点 A 的坐标为 $A(0, 0)$, 椭圆的方程为 $(x' + 2)^2 + 2(y' + 1)^2 - 6 = 0$, 即 $(x')^2 + 2(y')^2 + 4(x' + y') = 0$, 设直线 MN 的方程为 $mx' + ny' = 1$, 由 $\begin{cases} (x')^2 + 2(y')^2 + 4(x' + y') = 0 \\ mx' + ny' = 1 \end{cases}$ 可得 $(x')^2 + 2(y')^2 + 4(x' + y')(mx' + ny') = 0$, 即 $(2 + 4n)(y')^2 + 4(m + n)y'x' + (1 + 4m)(x')^2 = 0$, 所以

$(2 + 4n)\left(\frac{y'}{x'}\right)^2 + 4(m + n)\left(\frac{y'}{x'}\right) + 1 + 4m = 0$, 设 $M(x'_1, y'_1), N(x'_2, y'_2)$, 则 $k_1 = \left(\frac{y'_1}{x'_1}\right), k_2 = \left(\frac{y'_2}{x'_2}\right)$, 所以 $k_1 \cdot k_2 = \left(\frac{y'_1}{x'_1}\right)\left(\frac{y'_2}{x'_2}\right) = \frac{1 + 4m}{2 + 4n} = -1$, 即 $m \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) + n \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) = 1$, 因为直线 MN 的方程为 $mx' + ny' = 1$, 所以直线 MN 过定点 $P\left(-\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right)$, 所以在原坐标系中, 直线 MN 过定点 $P\left(-\frac{4}{3} + 2, -\frac{4}{3} + 1\right)$, 即 $P\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$. $AD \perp MN$ 于 D 可知, 点 D 在以 AP 为直径的圆上, 故所求定点 Q 恰为 AP 的中点, 所以 $Q\left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

评注:解决本题的关键是能否看清问题的本质所在, 从结论出发, 不难发现只需证明点 D 恰在一个以定点 Q 为圆心的定圆上, 若对定理比较熟悉, 则从条件出发很容易发现动直线 MN 必经过一个定点, 从而实现条件与结论的“无缝对接”, 解题的思路就显得自然, 解题的过程也显得简洁.

例 3 (2020 年高考全国 I 卷理科数学第 20 题第 (2) 小题) 如图 1, 已知 A, B 是椭圆 $T: \frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ 的左、右顶

图 1

点, P 为直线 $x = 6$ 上的动点, 直线 PA 与椭圆的另一交点为 C , 直线 PB 与椭圆的另一交点为 D . 求证: 直线 CD 过定点.

分析:不难发现当点 P 在直线 $x = 6$ 上运动时, 直线 PA, PB 斜率的比值为定值, 又注意到直线 DB, DA 斜率的积为定值, 所以可得直线 AC, AD 的斜率的积为定值, 从而问题就化归为运用定理可解决的问题了.

解答:易得 $A(-3, 0), B(3, 0)$, 设 $P(6, u)$, 则 $k_{AC} = k_{AP} = \frac{u}{9}, k_{BD} = k_{BP} = \frac{u}{3}$, 所以 $k_{BD} = 3k_{AC}$, 因为 D 在椭圆 T 上, 所以可设 $D(3\cos\theta, \sin\theta)$, 设直线 AC, AD 的斜率分别为 k_1, k_2 , 则 $k_{AD} = \frac{\sin\theta}{3\cos\theta + 3}, k_{BD} = \frac{\sin\theta}{3\cos\theta - 3}, k_{AD} \cdot k_{BD} = \frac{\sin^2\theta}{9\cos^2\theta - 9} = -\frac{1}{9}$, 所以 $k_1 \cdot k_2 = k_{AC} \cdot k_{AD} = \frac{1}{3}k_{BD} \cdot k_{AD} = -\frac{1}{27}$. 作坐标系的平移:

$\begin{cases} x+3=x', \\ y=y', \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x=x'-3, \\ y=y', \end{cases}$ 则在新坐标系 $x'o'y'$ 中, 点 A 的坐标为 $A(0,0)$, 椭圆的方程为 $(x'-3)^2 + 9y'^2 - 9 = 0$, 即 $(x')^2 + 9(y')^2 - 6x' = 0$, 设直线 CD 的方程为 $mx' + ny' = 1$, 由 $\begin{cases} (x')^2 + 9(y')^2 - 6x' = 0, \\ mx' + ny' = 1 \end{cases}$ 可得 $(x')^2 + 9(y')^2 - 6x'(mx' + ny') = 0$, 即 $9(y')^2 - 6ny'x' - (6m-1)(x')^2 = 0$, 所以 $9\left(\frac{y'}{x'}\right)^2 - 6n\left(\frac{y'}{x'}\right) - (6m-1) = 0$, 设 $C(x'_1, y'_1), D(x'_2, y'_2)$, 则 $k_1 = \left(\frac{y'_1}{x'_1}\right), k_2 = \left(\frac{y'_2}{x'_2}\right)$, 所以 $k_1 \cdot k_2 = \frac{(y'_1)(y'_2)}{(x'_1)(x'_2)} = \frac{-6m+1}{9} = -\frac{1}{27}$, 所以 $m = \frac{2}{9}$, 故有 $m \cdot \frac{9}{2} + n \cdot 0 = 1$, 因为直线 CD 的方程为 $mx' + ny' = 1$, 所以直线 CD 过定点 $\left(\frac{9}{2}, 0\right)$, 所以在原坐标系中, 直线 CD 过

定点 $P\left(\frac{3}{2}, 0\right)$.

评注: 复杂的问题往往是由若干个简单的问题组合而成的, 所以把复杂问题进行必要的分解是解决复杂问题的有效途径之一, 上述解法从“直线 AC 和直线 BD 的斜率的比为定值”, “直线 AD 和直线 BD 的斜率的积为定值”到“直线 AC 和直线 AD 的斜率的积为定值”, 最终化归为基本类型的问题, 从而使问题得到解决.

圆锥曲线问题成为难点的一个重要原因是学生过不了“运算关”, 造成这一现象不外乎以下两方面的原因, 其一是运算能力, 特别是字母演算能力有待提高; 其二是由于方法选择不恰当, 把简单问题复杂化, 陷入繁杂的运算而不能自拔. 所以在提高运算能力的基础上, 掌握一些简化运算的招式, 缩短解题的“长度”显得很有必要, 上述介绍的构造齐次方程、利用坐标平移是简化运算重要手段之一.

再探圆锥曲线过准线上一点的切线性质

江苏省常州市第二中学 (213000) 许兵

著名数学家波利亚认为: “好的问题如同某种蘑菇一样, 它们都是成堆地生长的, 找到一个以后, 你应该在周围找一找, 很可能附近就有好几个”. 这种比喻形象而生动地说明了数学问题之间存在着紧密联系. 文[1]介绍了圆锥曲线过准线上一点切线的两个性质, 在此基础上, 文[2]得出了更一般性的结论, 本文通过一道高三模考题中, 介绍另一个与圆锥曲线准线上一点的切线有关的性质, 并对其进行探究, 与读者分享.

试题 (江苏省苏锡常镇四市 2021 届第一次模拟考试题) 已知 O 为坐标系原点, 椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F , 右准线为直线 n . 已知直线 l 上有且只有一个点到 F 的距离与到直线 n 的距离之比为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 直线 l 与直线 n 交于点 N , 过 F 作 x 轴的垂线, 交直线 l 于点 M , 求证: $\frac{|FM|}{|FN|}$ 为定值.

在分析试题后得到 $\frac{|FM|}{|FN|}$ 为定值 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 而椭圆的离心率也刚好是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 这难道是巧合? 笔者通过 GeoGebra 数学软件的探究, 得到另一个与圆锥曲线准

线上一点的切线有关的性质, 并给出证明.

性质 已知直线 l 是圆锥曲线 Γ 的焦点 F 对应的准线, 过 l 上一点 P 作曲线 Γ 的两条切线 PA, PB , 过焦点 F 作直线 l' 与准线 l 平行, 并且分别与 PA, PB 分别交于点 G, H , 则 $\frac{GF}{PF} = \frac{FH}{PF} = e$, e 为圆锥曲线 Γ 的离心率, 当曲线 Γ 为抛物线时, $GF = FH = PF$.

下证圆锥曲线 Γ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的情况, 当曲线 Γ 为双曲线或抛物线时, 证法类似, 略.

证法一: 如图 1, 设切线 PA 的方程为 $y = kx$

$+ m$, 则 $y_P = -\frac{a^2k}{c} + m$,

$y_G = -kc + m$, 联立

$\begin{cases} y = kx + m, \\ b^2x^2 + a^2y^2 - a^2b^2 = 0, \end{cases}$ 消

去 y 得 $(a^2k^2 + b^2)x^2 + 2kma^2x + a^2m^2 - a^2b^2 = 0$, 由题意知 $\Delta = 0$, 整理得 $m^2 = a^2k^2 + b^2$, 所以 $\frac{GF^2}{PF^2} =$

$$\frac{(-kc + m)^2}{\left(-\frac{a^2k}{c} + m\right)^2 + \left(\frac{a^2}{c} - c\right)^2} = \frac{k^2c^2 - 2ckm + m^2}{\frac{a^4}{c^2}k^2 - \frac{2a^2}{c}km + \frac{b^4}{c^2} + m^2}$$

图 1