江苏省仪征中学 2022-2023 学年度高三化学寒假作业（三）

参考答案

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	A	B	A	A	C	D	B	D	C	B	C	D	D

二、非选择题

15. (14 分)

(1) AsO_3^{3-} 转化为 AsO_4^{3-} 0.5 (2 分)

(2) 温度升高, 反应 a 平衡逆向移动, $c(\text{Ca}^{2+})$ 下降, 反应 b 平衡逆向移动, $\text{Ca}_5(\text{AsO}_4)_3\text{OH}$ 沉淀率下降 (3 分)

(3) $\text{H}_3\text{AsO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 \rightleftharpoons \text{H}_3\text{AsO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$ (3 分)

(4) 调硫酸浓度约为 $7 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 冷却至 25°C , 过滤 (2 分)

(5) abc (2 分)

16. (15 分)

(1) 酯基 醚键 (2 分)

(2) 还原反应 (2 分)

(5) (5 分)

17. (15 分)

(1) $\text{ZnO} + 3\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O} + \text{NH}_4^+ + \text{HCO}_3^- \rightleftharpoons [\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + \text{CO}_3^{2-} + 4\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

(2) ① C (2 分) ② 增加水蒸气的流速 (或增加单位时间通入的水蒸气用量, 或在水蒸气出口采用多孔球泡等) (2 分)

(3) 将废催化剂粉碎后, 向其中加入略过量的稀硫酸, 搅拌下充分反应, 再向其中加入足量锌粉, 搅拌下充分反应, 至溶液由蓝色转变为无色; 过滤, 控制温度为 46°C , 向滤液中逐渐加入 Na_2CO_3 溶液至 pH 约为 6.8, 充分反应至产生大量固体 (5 分)

$$(4) n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 10.00 \text{ mL} \times 10^{-3} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

所以 10.00 mL 滤液中 $n(\text{I}_2) = \frac{1}{2} n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 5.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$ (1分)

则原滤液中 $n(\text{I}_2) = 5.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \times \frac{60}{10} = 3.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (1分)

初始所加入的碘为 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 50.00 \text{ mL} \times 10^{-3} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$

故被活性炭吸附的碘为 $5.0 \times 10^{-3} \text{ mol} - 3.0 \times 10^{-5} \text{ mol} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (1分)

$$2.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 254 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 10^3 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1} \div 0.5000 \text{ g} = 1016 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1} \quad (1分)$$

18. (14分)

② 排出溶解氧及装置内的空气(或氧气),防止纳米零价铁被空气中的氧气氧化,导致纳米铁的还原能力下降(2分);起搅拌作用,通入氮气破坏纳米零价铁粉的团聚效应,防止其聚集成团,削弱其反应活性(2分)(共4分)

(2) 形成 Fe-Cu和Fe-C原电池加快纳米铁粉去除 NO_3^- 的反应速率(2分);碳粉有强吸附性,可以吸附 NO_3^- (1分)(共3分)答“形成 Fe-Cu 原电池,加快反应”得1分、“形成Fe-C原电池,加快反应”得1分。仅答“构成原电池”得0分;

(3) pH>7时,pH增大, NO_3^- 氧化性减弱,反应减慢且纳米铁粉只将 NO_3^- 还原为 NO_2^- 溶解而留在溶液里(2分);

pH增大,易形成铁的氧化物或氢氧化物,覆盖在纳米铁的表面,阻碍反应进行,从而造成总氮去除率下降(2分)(共4分)